

# Caractéristiques des Antipsychotiques Atypiques à Action Prolongée

	Palmitate de palipéridone <sup>1,2</sup>		Suspension d'Aripiprazole injectable pour relâche prolongée <sup>3</sup>	Suspension injectable de Risperidone pour relâche prolongée <sup>4</sup>
	Une fois par mois (PP1M)	Une fois aux 3 mois (PP3M)		
<b>Nom commercial</b>	Invega Sustenna	Invega Trinza	Abilify Maintena	Risperdal Consta
<b>Compagnie productrice</b>	Janssen	Janssen	Otsuka/Lundbeck	Janssen
<b>Indication</b>	Traitement de la schizophrénie	Traitement de la schizophrénie	Soutien du traitement de la schizophrénie chez des patients adultes stables sur la version orale d'Aripiprazole	Gestion des symptômes de schizophrénie et autres désordres psychotiques associés.
<b>Contre-indication</b>	Hypersensibilité à la paliperidone, risperidone ou autres ingrédients de la formulation.	Hypersensibilité à la paliperidone, risperidone ou autres ingrédients de la formulation.	Hypersensibilité à l'aripiprazole ou autres composantes de la formulation.	Hypersensibilité à la paliperidone, risperidone ou autres ingrédients de la formulation.
<b>Initiation du traitement</b>	Doses d'initiation au jour 1 (150mg) et au jour 8 (100mg) (±4 jours)	Patients doivent être sur une dose stable d'Invega Sustenna (au moins 2 mois) et traité avec Invega Sustenna pendant au moins 4 mois. Par la suite, conversion de dose par un facteur de 3.5.	Dose de 400mg au premier jour (chez des patients stables sur Aripiprazole oral)	Dose d'initiation au jour 1
<b>Supplémentation orale</b>	Non	Non	Supplémentation avec 10-20mg d'aripiprazole oral pendant au moins 14 jours. Dans le cas d'un changement d'antipsychotique, maintien de l'ancien antipsychotique pendant 14 jours.	Supplémentation avec l'antipsychotique oral choisi pendant 3 semaines.
<b>Maintenance du traitement</b>	Aux 4 semaines	Aux trois mois	Aux 4 semaines	Aux 2 semaines
<b>Site d'injection</b>	IM Deltoïde ou Glutéal	IM Deltoïde ou Glutéal	IM Deltoïde ou Glutéal	IM Deltoïde ou Glutéal
<b>Doses disponibles</b>	50, 75, 100, 150 mg	175, 263, 350, 525 mg	300, 400mg	12.5, 25, 37.5, 50mg
<b>Présentation</b>	Seringues pré-remplies, 2 longueurs d'aiguille	Seringues pré-remplies, 2 longueurs d'aiguille	Vial de produit en poudre, Vial de 2.0mL de solvant, seringues et matériel pour la reconstitution.	Vial de produit en poudre, Vial. De 2.0mL de solvant, seringues et matériel de reconstitution.
<b>Reconstitution</b>	Non	Non (Besoin de 15 secondes d'agitation vigoureuse pour resuspension)	1.9mL de solvant pour dose de 400mg, 1.5mL pour une dose de 300mg	2.0 mL de solvant pour chaque dose
<b>Réfrigération</b>	Non	Non	Non	Oui
<b>Calibres des seringues et utilisation suggérée</b>	1 po. gauge 23 ou 1.5 po.. gauge 22 (Ajuster pour poids et site d'injection)	1 po. gauge 23 ou 1.5 po.. gauge 22 (Ajuster pour poids et site d'injection)	1.5 po. gauge 23 ou 2 po.. gauge 22 (Ajuster pour poids et site d'injection)	2 po. gauge 20 (glutéal) 1 po. gauge 22 (deltoïde)