

Tolérabilité des antidépresseurs

Fréquence non ajustée (%) des effets indésirables fréquents rapportés dans les monographies de produit

	Nausées	Constipation	Diarrhée	Sécheresse buccale	Céphalées	Étourdissements	Somnolence	Nervosité	Anxiété	Agitation	Insomnie	Fatigue	Sudation	Asthénie	Tremblements	Anorexie	Augmentation de l'appétit	Gain de poids	Dysf. sexuelle chez l'homme
Citalopram	21		8	19				3	3	2		5	11		8	4			9
Escitalopram	15	4	8	7	3	6	4	2	2		8	5	3		2		2	2	10
Fluoxétine	21			10			13	14	12		16		8	9	10	11			2
Fluvoxamine	37	18	6	26	22	15	26	2	2	16	14		11	5	11	15			1
Paroxétine	26	14	11	18	18	13	23	5	5	2	13		11	15	8		1		16
Sertraline ^a	26	8	18	16	20	12	13	3	3	6	16	11	8		11	3	1		16
Desvenlafaxine ^b	22	9		11		13	4	< 1	3		9	7	10		2				6
Duloxétine	20	11	8	15		8	7		3		11	8	6		3				10
Lévomilnacipram	17	9		10	17	8			2		6		9						11
Milnacipran	12	7		9	10				4		7	3	4		3				
Venlafaxine IR	37	15	8	22	25	19	23	13	6	2	18		12	12	5	11			18
Venlafaxine XR	31	8	8	12	26	20	17	10	2	3	17		14	8	5	8			16
Agomélatine ^c	C	C	C		C	C	C		C		C	C	C						5
Bupropion SR ^d	11	7	4	13	28	7	3	5	5	2	8		2	2	3				
Bupropion XL	13	9		26	34	6			5	2	16				3				
Mirtazapine		13		25		7	54							8	7		17	12	
Moclobémide	5	4	2	9	8	5	4	4	3	5	7	3	2	1	5				
Vilazodone ^e	24		29	7	14	8	5				6	3					3	2	
Vortioxétine ^f	23	4	5	6		5	3				3	3	2						< 1

0 à 9 %

10 à 14 %

15 % et plus

Lorsque plusieurs doses étaient présentées séparément, seules les données concernant la dose thérapeutique la plus faible ont été retenues.

^a Toutes indications confondues; ^b Dose de 50 mg; ^c Effets fréquents ($\geq 1\%$ et $< 10\%$); ^d Dose de 100 à 150 mg;

^e Dose de 40 mg; ^f Dose de 10 mg.

[Retour à l'algorithme](#)

